

COVID-19 ИЛИ ГРИПП ?

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

ГРИПП

COVID-19

СИМПТОМЫ



ЖАР
(ЧАСТО- ВНЕЗАПНОЕ
НАЧАЛО)

ЖАР



ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

УТОМЛЯЕМОСТЬ



КАШЕЛЬ

КАШЕЛЬ
(ОБЫЧНО СУХОЙ)



БОЛЬ В ГОРЛЕ

ЧУВСТВО
«ЗАЛОЖЕННОСТИ»
В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ



ОЗНОБ

ОДЫШКА



МЫШЕЧНЫЕ БОЛИ

ДИАРЕЯ, РВОТА
(РЕДКО)



В ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЯХ СИМПТОМЫ
МОГУТ СТАТЬ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ

ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ

РЕЖЕ

- МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПНЕВМОНИЯ
- ВОЗМОЖЕН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД



ЧАЩЕ

- ПНЕВМОНИЯ
- ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
- ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС СИНДРОМ
- СМЕРТЬ

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ЕСТЬ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБНЫЕ
ОБЛЕГЧИТЬ СИМПТОМЫ.
СОКРАТИТЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЗНИ



НЕТ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ,
НО ОНИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ



ВАКЦИНА

ВАКЦИНА ДОСТУПНА
ЭФФЕКТИВНО
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИЛИ
СНИЖАЕТ ТЯЖЕСТЬ
ГРИППА



ВАКЦИНА НАХОДИТСЯ В СТАДИИ
РАЗРАБОТКИ



ПРОФИЛАКТИКА



ЧАСТОЕ , ТЩАТЕЛЬНОЕ МЫТЬЕ РУК



РЕСПИРАТОРНЫЙ ЭТИКЕТ



ПРЕБЫВАНИЕ ДОМА ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ



ОГРАНИЧЕНИЕ КОНТАКТОВ С ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

ДИАГНОСТИКА

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ МОЖЕТ
БЫТЬ ПОСТАВЛЕН ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ЛАБОРАТОРНОГО
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
ВИРУСА



ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ
ПОСТАВЛЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ТЕСТА (ВЫЯВЛЕНИЕ РНК 2019-nCoV
МЕТОДОМ ПЦР)