


Проведение дезинфекционных мероприятий. В очаге, в течение всего периода времени лечения пациента и после его окончания проводят дезинфекционные мероприятия, а именно текущую и заключительную дезинфекцию.



Текущая дезинфекция.

Проводит либо сам больной, либо лицо, ухаживающее за ним. Лицо, ухаживающее за больным, должно соблюдать правила личной гигиены (работать в халате, шапочке или косынке, перчатках) после контакта с больным или его личными предметами тщательно мыть руки с мылом.

Для дезинфекции можно использовать: **кипячение, чистка щетками и пылеотсосом**, лучше с увлажнителем, **многократное проглаживание горячим утюгом**. Также использование безопасных **моюще-чистяще-дезинфицирующих фунгицидных средств**, разрешенных в быту, использование которых не требует усиленных мер индивидуальной защиты.

Больного обеспечивают: **отдельной постелью, личным полотенцем и предметами ухода (расчески, мочалки, губки, таз для мытья ног, щетки для чистки одежды, маникюрные и педикюрные принадлежности, носки, обувь и др.)**.

Верхняя одежда больного, включая головные уборы, обувь, перчатки должны храниться **отдельно** от одежды членов семьи.

Для сбора грязного белья больного используется мешок или корзина, и его хранение до дезинфекции проводится **отдельно** от членов семьи.

Обеззараживание белья проводят кипячением в воде или 2% раствором каустической соды в течение 15 минут с момента закипания или способом замачивания в дезинфицирующем средстве. Запрещается сдавать белье больного в стирку в общественную прачечную.

При поражении волосистой части головы необходимо ношение шапочки, плотно прилегающей к голове, или косынке из легко стирающейся ткани, закрывающую всю волосистую часть головы.

В комнате или квартире где проживает больной ежедневно поводят влажную уборку с использованием моющих или моюще-дезинфицирующих средств. Для этих целей выделяют отдельный уборочный инвентарь (тряпка, швабра без щетины, ведро, уборочная ветошь).

На время болезни из комнаты убирают ковры и паласы; на мягкую мебель надевают чехлы или затягивают их полиэтиленовой пленкой, постельные принадлежности (матрац, подушку, одеяло) ежедневно чистят увлажненной щеткой или пылесосом. Щетки, пылесборник пылесоса после применения дезинфицируют с использованием растворов дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое оборудование дезинфицируют моюще-чистяще-дезинфицирующими или моюще –дезинфицирующими средствами, разрешёнными в быту, в соответствии с режимом, изложенным в инструкции.

После проведения уборки уборочный инвентарь подлежит обеззараживанию методом кипячения или способом погружения в раствор дезинфицирующего средства. После дезинфекции его прополаскивают, высушивают и хранят в сухом виде в специально выделенной для этого отдельной емкости.

Верхнюю одежду, чехлы с мебели чистят увлажненной щеткой, либо пылесосят. Одежду рекомендуется проглаживать несколько раз горячим утюгом через увлажненную ткань. Щетки, пылесборник пылесоса после применения дезинфицируют.

Инфицированный материал (повязки, марлевые салфетки и т.д.) обеззараживают путем погружения в раствор дезинфицирующих средств либо сжигают.

Заключительная дезинфекция.

При заключительной дезинфекции обязательной обработке подвергают помещение, где находился больной, места общего пользования, объекты в окружении больного и вещи, бывшие в применении. Объем заключительной дезинфекции, а также перечень предметов подлежащих камерной дезинфекции, зависит от места локализации патологического процесса. Так при поражении гладкой кожи голени или стопы – чулки, носки, колготки, обувь.

Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы и пр.), чехлы с мебели, одежду больного (шапки, обувь, перчатки, пальто, шубы и пр.), книги, мягкие игрушки вне зависимости от места локализации очага заболевания подвергаются камерной дезинфекции по паровому,

паровоздушному или пароформалиновому методу в зависимости от характера объектов и выдерживания объектами условий обработки выбранным методом (таблица 1)

Таблица 1

Режимы камерного обеззараживания объектов, контаминированных грибами

Обрабатываемые объекты	Норма загрузки (кг на 1м ²)	Норма расхода формалина (мл на 2 м ³ объема камеры)	Температура (°C)	Экспозиция (мин)
Пароформалиновый метод				
Обувь и другие изделия из кожи, кожезаменителя. Меховые изделия, сапоги на меху	35	120	55-57	90
	18	300	49-51	240
Паровоздушный метод				
Одежда хлопчатобумажная и шерстяная. Изделия из химических волокон.	60	-	80-90	40
Постельные принадлежности.	60	-	97-98	15
Книги	80-1000экз.	-	70-75	180
Паровой метод				
Одежда. Постельные принадлежности. Нательное и постельное белье.	50	-	100	60
	60-72	-	104	30

Постельное, нательное белье, полотенца, салфетки, косынки, перевязочный материал, чехлы от мебели замачиваются в дезинфицирующем растворе на время экспозиции.

Расчески, щетки, ножницы, мочалки, губки, резиновые и пластиковые игрушки, предметы ухода за больными, тазы, уборочный инвентарь, медицинские отходы также дезинфицируются погружением в дезинфицирующие растворы.

Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование, место содержания животного обеззараживают способом орошения дезинфицирующим раствором.

Для дезинфекции используют фунгицидные средства, разрешенные для применения способом орошения. Предпочтение отдают таблетированным формам препаратов на основе дихлоризоцианурата натрия и трихлоризоциануровой кислоты, хлорпроизводным гидантоина, композиционным средствам, содержащим КПАВ.

В день проведения заключительной дезинфекции назначают мытье больного и всех проживающих с ним (контактных) лиц и смену белья.