

Корь

Корь — одно из самых заразных инфекционных заболеваний: каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним **неиммунных** к кори людей

Симптомы кори

- Красная сыпь
- Жар
- Сухой кашель
- Насморк
- Боль в горле
- Конъюнктивит

Схема вакцинации

V—в 12 месяцев

RV—в 6 лет



Осложнения кори

- Пневмония
- Острый средний отит
- Синусит
- Кератоконъюнктивит
- Коревой энцефалит

Клиника

1) Инкубационный период 9-21 день.

2) Начальный (3-4 дня) повышение температуры тела до 38-40°C, ринит, фарингит, конъюнктивит, светобоязнь, головная боль, снижение аппетита, нарушение сна.

3) Период высыпаний (на 4-5 день) сыпь за ушами, на переносице, за первые сутки сыпь распространяется на лицо, шею, верхнюю часть груди и плечи, на 2-е сутки туловище, на 3-4 дистальные части рук и ног.

4) Пигментация с 3-4 дня сыпь приобретает синюшно-бурый оттенок. (длится 7-14 дней), возможно появление мелкого отрубевидного шелушения.

Корь

Корь – острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи, проявляющееся в типичной манифестной форме кашлем и (или) насморком, конъюнктивитом, общей интоксикацией, поэтапным высыпанием пятнисто-папулезной сливной сыпи и пигментацией.

Источником инфекции являются больные (дети, взрослые) и носители (без клинического проявления).

Путь передачи возбудителя - воздушно-капельный. Вирус выделяется из организма при кашле, чихании, слезотечении, разговоре и с потоком воздуха разносится на значительные расстояния, в том числе и по вентиляционным каналам, поэтому заражение возможно и при отсутствии непосредственного контакта с больным.

Заболевание проходит в 4 этапа: инкубационный период → начальный период → период высыпаний → период пигментации.

Инкубационный период длится 9-21 день.

Начальный период заболевания проявляется катаральным синдромом, его длительность обычно составляет 3-4 дня. Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 38-40 °С, возникновения катаральных явлений со стороны верхних дыхательных путей (ринит, фарингит), конъюнктивита, светобоязни, нарастающих признаков интоксикации (головной боли, резкого ухудшения самочувствия, снижения аппетита, нарушение сна), у детей младшего возраста выражено беспокойство. Катаральные явления в динамике усиливаются, развивается ларинготрахеит.

Период высыпания начинается на 4-5 день от начала болезни. Высыпания происходят этапно. Первые элементы сыпи появляются за ушами, на переносице, за первые сутки сыпь распространяется на лицо, шею, верхнюю часть груди и плечи, на 2-е сутки сыпь покрывает туловище, на 3-4-е сутки дистальные части рук и нижние конечности. Сыпь пятнисто-папулезная, первоначально мелкая, затем элементы сыпи увеличиваются в размерах, сливаются, становятся яркими и приобретают типичный вид - неправильной формы, крупные элементы пятнисто-папулезные, ярко-красного цвета.

Период пигментации начинается с 3-4 дня появления сыпи и протекает также этапно. Сыпь начинает приобретать синюшно-бурый оттенок. Период пигментации длится 7-14 дней, возможно появление мелкого отрубевидного шелушения. Общее состояние больного улучшается, температура нормализуется, уменьшается выраженность катаральных явлений.

Одно из **наиболее частых осложнений** - пневмония, нередко развивается острый средний отит, синусит, кроме того, возможно развитие кератоконъюнктивита, осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Тяжелым осложнением является коревой энцефалит (менингоэнцефалит), который развивается на 4-5 день после появления сыпи, или позже, характеризуется тяжелым течением и высоким риском неблагоприятного (летального) исхода.

Если Вы заподозрили корь у ребенка или взрослого: вызовите врача на дом. Не занимайтесь самолечением!

Уважаемые родители, помните!

Единственной мерой профилактики кори на сегодняшний день является иммунизация. Иммунизация проводится в плановом порядке, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021г. № 1122н. Вакцинация против кори проводится в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет.

Помните, что дети, не прошедшие вакцинацию, согласно статистике, болеют намного чаще и тяжелее привитых. Прививка уменьшает риск заражения кори до минимума, и даже если ребенок все-таки заболел, то протекать болезнь будет значительно легче, без осложнений.